


Station biologique – Ardenne médian

Hydrologie	Largeur moyenne	Profondeur dominante	Morphologie	Substrats dominants	Caractéristiques complémentaires
- Basses eaux - Faciès lentique dominant	2.6 m	0.1 à 0.5 m	- Méandré - Encaissé	- Cailloux sur zone lotique et vase sur zone lentique - Racines présentes	- Ripisylve arborescente mais quelques secteurs éclairés - Gué en amont



Note IBMR	Niveau trophique	Robustesse	Nombre de taxons total / contributifs	Recouvrement global (%)
9,0	FORT	8,9	11 / 9	1,3

La végétalisation du cours d'eau est très faible, en faciès lotique (0,6% de recouvrement) comme en faciès lentique (1,4%).

La diversité est plutôt faible : 11 taxons recensés dont 9 contributifs à l'IBMR, et seul deux groupes de végétaux sont présents : phanérogames et algues. Les phanérogames dominent d'ailleurs nettement les algues en termes de recouvrement. La plupart des taxons sont ubiquistes (peu indicateurs).

La note IBMR de cette station est de 9,0 ce qui correspond à un niveau de trophie fort. La robustesse est peu différente de la note IBMR, étant calculée à 8,9, ceci indiquant une relative fiabilité de l'indice.

Les *Callitriches* dominent nettement le peuplement végétal, tout particulièrement *Callitriche obtusangula*. Cette espèce, dont la cote spécifique est de 8, est indicatrice de concentrations relativement élevées en NH_4^+ . Par ailleurs, plusieurs herbiers d'hélophytes sont observés près des berges.